

Bollettino n° 2 / 2025 del 02 Maggio 2025

Poročilo št. 2 2025 dne 02. Maja 2025


REPORT SETTIMANALE SULLO STATO DEI VIGNETI NEL CARSO TRANSFRONTALIERO

TEDENSKO POROČILO O STANJU V VINOGRADIH NA ČEZMEJNEM KRASU

Preparato da / Pripravil: Perleuve S.r.l.



MAPPA DEI VIGNETI CHE MONITORIAM / ZEMLJEVID VINOGRADOV, KI JIH SPREMLJAMO



Figura/Slika 1: Mappa dei vigneti monitorati nell'ambito del progetto Agrotur+ / Zemljevid vinogradov, ki jih spremljamo v okviru projekta Agrotur+


La figura 1 mostra la mappa dei vigneti in cui monitoriamo settimanalmente malattie e parassiti nell'ambito del progetto Agrotur+.

Slika 1 prikazuje zemljevid vinogradov, v katerih tedensko spremljamo bolezni in škodljivce v okviru projekta Agrotur+.


PREVISIONI METEO / VREMENSKA PROGNOZA

Nelle immagini successive è mostrata una previsione approssimativa del tempo per il periodo dal 02.05.2025 al 06.05.2025.


V naslednjih slikah je prikazana okvirna napoved vremena za obdobje 02.05.2025-06.05.2025



Figura/Slika 2: San Dorligo Della Valle – Dolina



Figura/Slika 3: Carso italiano – Italijanski Kras (Monrupino – Repen)



Figura/Slika 4: Carso sloveno – Slovenski Kras (Komen)

Le previsioni meteo prevedono pioggia nelle giornate di lunedì e martedì.

Meteorološke napovedi predvidevajo dež v ponedeljek in torek.

Comune	Ultimi 7 Giorni					Prossimi 5 Giorni				
	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG
Duino-Aurisina	2	21,3	13,3	17,3	22,2	2	57,0	14,5	17,4	20,0
Monrupino	2	16,5	11,0	15,9	21,5	2	50,9	13,5	17,0	20,8
San Dorligo della Valle	2	23,4	12,6	16,7	21,5	2	40,0	15,3	18,3	21,5
Sgonico	2	16,4	11,6	16,5	21,7	2	51,4	13,5	17,0	20,8

Comune	Ultimi 7 Giorni					Prossimi 5 Giorni				
	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG
Sveto	2	18,3	12,5	17,0	22,2	1	57,3	14,4	17,6	21,1

Tabella/Preglednica 1: Previsioni meteo in forma tabellare. Vremenske napovedi v formatu preglednice

AMPELOPATIE / BOLEZNI VINSKE TRTE

PERONOSPORA

Dati del monitoraggio dei vigneti / Podatki opazovanj vinogradov:

Dai rilevamenti fatti non risultano infezioni delle principali patologie: peronospora, oidio e escoriosi.

Ni bilo zaslediti nobene okužbe z glavnimi patologijami: peronospora, oidij in črna pegavost.

Probabilità di infezione di peronospora - Možnost infekcije peronospore

Probabilità di infezione di peronospora nei prossimi giorni (dal 02.05.2025 al 06.05.2025). Valori al disopra del 50% indicano un'elevata probabilità di infezione.

Možnost infekcije peronospore v naslednjih dneh (od 02.05.2025 do 06.05.2025). Vrednosti nad 50% kažejo na visoko možnost okužbe.

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Duino-Aurisina		0		32,35 %		45,98 %		45,98 %		-	
Monrupino		2,17 %		48,73 %		48,73 %		-		-	
San Dorligo della Valle		2,85 %		40,66 %		40,66 %		-		-	
Sgonico		2,17 %		48,88 %		48,88 %		-		-	

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Sveto		1,10 %		50,38 %		50,38 %		-		-	

Tabella/Preglednica 2: Probabilità di infezione di peronospora nei prossimi giorni (blocchi da 3 giorni es. 0=oggi, 1=domani, 2=dopodomani). / Možnost infekcije peronospore v naslednjih dneh (v skupinah po tri dni npr. 0= danes, 1=jutri, 2=pojutrišnjem)

OIDIO – OIDIJ

Dati del monitoraggio / Podatki opazovanj vinogradov:

Oidio non ancora presente neanche nella zona di San Dorligo della Valle, in un vigneto ad alto rischio con storicità di infezioni precoci e aggressive.

Oidij ni prisoten niti na območju Doline, v vinogradu z visoko nevarnostjo, kjer so bile v zadnjih letih pogoste zgodnje in agresivne okužbe.

Probabilità di infezione di oidio - Možnost infekcije oidija

Probabilità di infezione di oidio nei prossimi giorni. Valori al disopra del 50% indicano un'elevata probabilità di infezione.

Možnost infekcije oidija v naslednjih dneh. Vrednosti nad 50% kažejo na visoko možnost okužbe.

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Duino-Aurisina		0		89,53 %		76,75 %		76,75 %		-	
Monrupino		19,77 %		73,08 %		73,08 %		-		-	
San Dorligo della Valle		27,47 %		79,61 %		79,61 %		-		-	
Sgonico		19,77 %		72,95 %		72,95 %		-		-	


Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Sveto		10,10 %		71,70 %		71,70 %		-		-	

Tabella/Preglednica 3: Probabilità di infezione di oidio nei prossimi giorni (blocchi da 3 giorni es. 0=oggi, 1=domani, 2=dopodomani). / Možnost infekcije oidija v naslednjih dneh (v skupinah po tri dni npr. 0= danes, 1=jutri, 2=pojutrišnjem)

Nei vigneti che hanno avuto forti infezioni nella scorsa stagione, si richiede attenzione nella gestione agronomica del vigneto (eseguire subito la potatura verde e la defogliatura delle prime due foglie basali) e nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari per limitare il rischio di infezione e seguente diffusione nel prosieguo della stagione.

V tistih vinogradih, ki so v prejšnjih letih imeli hude mere okužbe je potrebna velika pozornost pri agronomskem upravljanju vinograda (čimprej izvedite zeleno čiščenje in razlistovanje prvih dveh bazalnih lističec) in izvajanju fitosanitarnih ukrepov za omejitev možnosti infekcij in širjenja bolezni v nadaljevanju sezone.

FENOLOGIA / FENOLOGIJA



Foglie / Listi

I germogli presentano da 2 a 6 foglie distese (BBCH 12-16) a seconda delle zone e della varietà.

Poganjki imajo 2 do 6 odprtih listov (BBCH 12-16) glede na lego in na vinsko sorto.

	Refosco nostrano			
	DUINO-AURISINA	GRADNJE	SVETO	TOMAJ
	17 - 25 Apr	14.0	13.0	14.0
Vitovska				
	DUINO-AURISINA	KOMEN	MONRUPINO	SAN DORLIGO DELLA VALLE
	13.0	12.0	13.0	16.0
				SGONICO
				14.0

Tabella/Preglednica 4: Le fasi fenologiche delle viti monitorate vengono descritte tramite gli indici BBCH. / Fenološke faze kontroliranih vinogradov so opisane z BBCH indeksom.

CONSIGLIO DI TRATTAMENTO / NASVET ZA ŠKROPLJENJE

Consigliamo l'applicazione preventiva (prima delle piogge) solamente nei vigneti con almeno due foglie distese (BBCH 12+) di:

CONDUZIONE BIOLOGICA

1. Rame solfato neutralizzato (poltiglia bordolese formulazione disperss) alla dose di 140 g/ha di rame metallo in associazione al solfato tribasico alla dose di 65 g/ha di rame metallo. Complessivamente a distribuire 205 g/ha di rame metallo.
2. Zolfo micronizzato alla dose di 2 kg/ha (3 kg/ha nei vigneti ad alto rischio)

CONDUZIONE INTEGRATA

1. Prodotto commerciale a base di ditianon in associazione a fosfonato di potassio alla dose di 3 L/ha
2. Zolfo micronizzato alla dose di 2 kg/ha (3 kg/ha nei vigneti ad alto rischio)

Svetujemo škropljenje pred dežjem samo vinogradov, imajo vsaj dva odprta lista (BBCH 12+) s sledečimi aktivnimi snovmi:

EKOLOŠKA PRIDELAVA

1. Bakrov nevtraliziran sulfat (poltiglia bordolese fomulacija disperss) v odmerku 140 g/ha v asociaciji z tribazičnim sulfatom v odmerku 65g/ha. Celotni odmerek bakra 205 g/ha.
2. Močljivo žveplo 2 kg/ha (3 kg/ha v vinogradih z močnimi lanskimi okužbami)

INTEGRIRANA PRIDELAVA

1. Škopivo na osnovi ditianona v kombinaciji s kalijevim fosfonatom v odmerku 3 L/ha.
2. Močljivo žveplo v odmerku 2 kg/ha (3 kg/ha v vinogradih z močnimi lanskimi okužbami)