

Bollettino n°3/ 2025 del 06 Maggio 2025

Poročilo št. 3 / 2025 dne 06 Maja 2025


REPORT SETTIMANALE SULLO STATO DEI VIGNETI NEL CARSO TRANSFRONTALIERO

TEDENSKO POROČILO O STANJU V VINOGRADIH NA ČEZMEJNEM KRASU

Preparato da / Pripravil: Perleuve S.r.l.



MAPPA DEI VIGNETI CHE MONITORIAM / ZEMLJEVID VINOGRADOV, KI JIH SPREMLJAMO



Figura/Slika 1: Mappa dei vigneti monitorati nell'ambito del progetto Agrotur+ / Zemljevid vinogradov, ki jih spremljamo v okviru projekta Agrotur+


La figura 1 mostra la mappa dei vigneti in cui monitoriamo settimanalmente malattie e parassiti nell'ambito del progetto Agrotur+.

Slika 1 prikazuje zemljevid vinogradov, v katerih tedensko spremljamo bolezni in škodljivce v okviru projekta Agrotur+.


PREVISIONI METEO / VREMENSKA PROGNOZA

Nelle immagini successive è mostrata una previsione approssimativa del tempo per il periodo dal 5.5.2025 al 11.5.2025.


V naslednjih slikah je prikazana okvirna napoved vremena za obdobje 5.5.2025 – 11.5.2025



Figura/Slika 2: San Dorligo Della Valle – Dolina



Figura/Slika 3: Carso italiano – Italijanski Kras (Monrupino – Repen)



Figura/Slika 4: Carso sloveno - Slovenski Kras (Komen)

Le previsioni meteo prevedono rovesci giovedì, con schiarite a partire da venerdì.

Meteorološke napovedi predvidevajo dež v četrtek, bolj jasno vreme pa od petka naprej.

Comune	Ultimi 7 Giorni						Prossimi 5 Giorni					
	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG		N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG	
Dulino-Aurisina	1	1,3	14,4	19,2	24,3		4	54,8	12,3	14,6	16,8	
Monrupino	0	1,0	11,3	17,6	24,2		4	64,1	10,1	13,6	17,0	
San Dorligo della Valle	1	1,6	13,8	18,9	24,5		4	54,3	12,1	14,8	17,6	
Sgonico	1	1,1	12,1	18,2	23,9		4	51,2	10,1	13,6	17,1	

Comune	Ultimi 7 Giorni						Prossimi 5 Giorni					
	N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG		N° GG Pioggia > 1 mm	MM Pioggia Cumulati	T MIN AVG	T MED AVG	T MAX AVG	
Sveto	1	4,0	13,4	18,6	24,3		4	75,6	10,9	13,9	16,9	

Tabella/Preglednica 1: Previsioni meteo in forma tabellare. Vremenske napovedi v formatu preglednice

AMPELOPATIE / BOLEZNI VINSKE TRTE

PERONOSPORA

Dati del monitoraggio dei vigneti / Podatki opazovanj vinogradov:

Dai rilevamenti fatti non risultano infezioni delle principali patologie: peronospora, oidio e escoriosi.

Ni bilo zaslediti nobene okužbe z glavnimi patologijami: peronospora, oidij in črna pegavost.

Probabilità di infezione di peronospora - Možnost infekcije peronospore

Probabilità di infezione di peronospora nei prossimi giorni (dal 05.05.2025 al 11.05.2025). Valori al disopra del 50% indicano un'elevata probabilità di infezione.

Možnost infekcije peronospore v naslednjih dneh (od 5.5.2025 do 11.05.2025). Vrednosti nad 50% kažejo na visoko možnost okužbe.

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Duino-Aurisina		38,24 %		35,79 %		15,93 %		13,27 %		0,51 %	
Monrupino		39,87 %		35,32 %		17,93 %		13,81 %		0,02 %	
San Dorligo della Valle		36,20 %		32,00 %		17,93 %		12,17 %		1,56 %	
Sgonico		30,24 %		29,94 %		17,26 %		13,81 %		0,02 %	

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Sveto		48,45 %		39,83 %		21,38 %		15,28 %		0,07 %	

Tabella/Preglednica 2: Probabilità di infezione di peronospora nei prossimi giorni (blocchi da 3 giorni es. 0=oggi, 1=domani, 2=dopodomani). / Možnost infekcije peronospore v naslednjih dneh (v skupinah po tri dni npr. 0= danes, 1=jutri, 2=pojutrišnjem)

OIDIO – OIDIJ

Dati del monitoraggio / Podatki opazovanj vinogradov:

Oidio presente nella zona di San Dorligo della Valle, in un vigneto ad alto rischio con storicità di infezioni precoci e aggressive. Per ora le infezioni presenti si limitano a pochissime foglie e germogli del vigneto.

Oidij prisoten na območju Doline, v vinogradu z visoko nevarnostjo, kjer -so bile v zadnjih letih pogoste zgodnje in agresivne okužbe. Zdaj se okužbe nahajajo le na zelo nizkem številu listov in poganjkov vinograda.



Probabilità di infezione di oidio - Možnost infekcije oidija

Probabilità di infezione di oidio nei prossimi giorni. Valori al disopra del 50% indicano un'elevata probabilità di infezione.

Možnost infekcije oidija v naslednjih dneh. Vrednosti nad 50% kažejo na visoko možnost okužbe.

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Duino-Aurisina		82,02 %		82,81 %		93,86 %		88,30 %		4,33 %	
Monrupino		82,66 %		82,69 %		96,16 %		88,06 %		0,37 %	
San Dorligo della Valle		84,89 %		85,19 %		88,09 %		84,93 %		13,50 %	
Sgonico		77,65 %		86,45 %		92,92 %		88,06 %		0,37 %	

Comune	↑↓	0 - 2	↑↓	1 - 3	↑↓	2 - 4	↑↓	3 - 5	↑↓	4 - 6	↑↓
Sveto		74,04 %		78,68 %		93,28 %		94,48 %		1,40 %	

Tabella/Preglednica 3: Probabilità di infezione di oidio nei prossimi giorni (blocchi da 3 giorni es. 0=oggi, 1=domani, 2=dopodomani). / Možnost infekcije oidija v naslednjih dneh (v skupinah po tri dni npr. 0= danes, 1=jutri, 2=pojutrišnjem)

Nei vigneti che hanno avuto forti infezioni nella scorsa stagione, si richiede attenzione nella gestione agronomica del vigneto (eseguire subito la potatura verde e la defogliatura delle prime due foglie basali) e nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari per limitare il rischio di infezione e seguente diffusione nel prosieguo della stagione.

V tistih vinogradih, ki so v prejšnjih letih imeli hude mere okužbe je potrebna velika pozornost pri agronomskem upravljanju vinograda (čimprej izvedite zeleno čiščenje in razlistovanje prvih dveh bazalnih lističec) in izvajanju fitosanitarnih ukrepov za omejitev možnosti infekcij in širjenja bolezni v nadaljevanju sezone.

FENOLOGIA / FENOLOGIJA

Foglie / Listi



I germogli presentano da 4 a 8 foglie distese (BBCH 14-18) a seconda della zona e della varietà.
Poganjki imajo od 4 do 8 odprte liste (BBCH 14-18) glede na lego in na vinsko sorto.

Refosco nostrano				
DUINO-AURISINA	GRADNJE	SVETO	TOMAJ	
17.0	15.0	16.0	16.0	
Vitovska				
DUINO-AURISINA	KOMEN	MONRUPINO	SAN DORLIGO DELLA VALLE	SGONICO
15.0	14.0	15.0	18.0	16.0

Tabella/Preglednica 4: Le fasi fenologiche delle viti monitorate vengono descritte tramite gli indici BBCH. / Fenološke faze kontroliranih vinogradov so opisane z BBCH indeksom.

CONSIGLIO DI TRATTAMENTO / NASVET ZA ŠKROPLJENJE

Consigliamo l'applicazione preventiva (prima delle piogge di giovedì 8 maggio).

CONDUZIONE BIOLOGICA

1. Rame solfato neutralizzato (poltiglia bordolese formulazione disperss) o in alternativa ossicloruro alla dose di 150 g/ha di rame metallo complessivo.
2. Zolfo micronizzato alla dose di 2 kg/ha (3 kg/ha nei vigneti ad alto rischio)

CONDUZIONE INTEGRATA

1. Rame solfato neutralizzato (poltiglia bordolese formulazione disperss) o in alternativa ossicloruro alla dose di 150 g/ha di rame metallo complessivo
2. Fosfonato di potassio alla dose intermedia da etichetta
3. Zolfo micronizzato alla dose di 2 kg/ha (3 kg/ha nei vigneti ad alto rischio)

Svetujemo škropljenje pred dežjem, ki je predviden za četrtek 8 maja, s sledečimi aktivnimi snovmi:

EKOLOŠKA PRIDELAVA

1. Bakrov nevtraliziran sulfat (poltiglia bordolese fomulacija disperss) ali oksikorid v odmerku 150 g/ha skupnega kovinskega bakra.
2. Močljivo žveplo 2 kg/ha (3 kg/ha v vinogradih z močnimi lanskimi okužbami)

INTEGRIRANA PRIDELAVA

1. Bakrov nevtraliziran sulfat (poltiglia bordolese fomulacija disperss) ali oksikorid v odmerku 150 g/ha skupnega kovinskega bakra
2. Kalijev fosfonat v srednjem dovoljenem odmerku
3. Močljivo žveplo 2 kg/ha (3 kg/ha v vinogradih z močnimi lanskimi okužbami)