


Poročilo z dne 29. avgust 2019

Referenčno območje: slovenski in italijanski Kras

VREME:




Graf 1: Beležene in predvidene padavine in temperature (na desni strani osi) **na italijanskem Krasu.**

Temperatura(°C) - Temperatura (v °C); Pioggia(mm) - Dež (v mm); med - povprečna; min - najnižja; max - najvišja.

	Tempo	Precipitazioni		Temp.		Um. Rel.	Vento a 2m		
		Prob. %	mm	Min °C	Max °C		Descrizione	Dir.	Vel. km/h
giovedì 29		10	0	20,7	29	65	debole	O	5,5
venerdì 30		24	0	20	29,9	61	moderato	E-NE	14,8
sabato 31		34	0	20,4	30,5	57	debole	E-SE	8,7
domenica 01		10	0	20	30,5	57	debole	O-SO	3,7
lunedì 02		65	1,5	19,2	30,2	63	debole	SO	8,7
martedì 03		51	18,6	10,9	20,8	78	forte	E-NE	31,7
mercoledì 04		10	0	12,1	24,7	67	moderato	E-NE	20,6

Tabela 1: Podrobna vremenska napoved (**italijanski Kras**)



Graf 2: Beležene in predvidene padavine in temperature (na desni strani osi) **na slovenskem Krasu**.
Temperatura(°C) - Temperatura (v °C); Pioggia(mm) - Dež (v mm); med - povprečna; min - najnižja; max - najvišja.

	Tempo	Precipitazioni		Temp.		Um. Rel.	Vento a 2m		
		Prob. %	mm	Min °C	Max °C		Descrizione	Dir.	Vel. km/h
giovedì 29		20	0	19,9	28,8	69	debole	O	5,5
venerdì 30		28	0	18,8	29,5	65	moderato	E-NE	16,6
sabato 31		64	1,7	18,7	31,4	62	moderato	E	11,6
domenica 01		32	0,2	18	31,5	62	debole	O-SO	2,2
lunedì 02		70	4	17,2	30,2	67	debole	S-SO	7,3
martedì 03		59	7,3	14,3	19,1	81	forte	E-NE	32,8
mercoledì 04		10	0	13,7	24,4	68	moderato	E-NE	23,1

Tabela 2: Podrobna vremenska napoved (**slovenski Kras**)


35. teden	Zadnjih 7 dni					Napoved za naslednjih 5 dni		
Območje	število deževnih dni	najvišja količina dežja v mm	skupna količina dežja v mm	najvišja absolutna temperatura	najnižja absolutna temperatura	število deževnih dni	najvišja predvidena količina dežja v mm	skupna količina dežja v mm
italijanski Kras	3	2,1	3,4	31,4	18,9	1	1,5	1,5
slovenski Kras	4	7,6	11,7	30,7	15,3	2	4,0	5,7

Tabela 3: Vremenski podatki spremljanih območjih (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni).


Grafa 1 in 2 ter tabeli 1 in 2 prikazujeta vremenske podatke za zadnjih 7 ter napoved za naslednjih 5 dni.

POTEK GLAVNIH TEŽAV

Peronospora - *Plasmopara viticola* (Berl. in De Toni)



Graf 3: Analiza DSS (model Vite.net®) Peronospora (*Plasmopara viticola* (Berk. in M. A. Curtis) Berl. in De Toni, 1888): **italijanski Kras**.



Graf 4: Analiza DSS (model Vite.net®) Peronospora (*Plasmopara viticola* (Berk. in M. A. Curtis) Berl. in De Toni, 1888): **slovenski Kras**.

V grafu 3 in 4 je prikazan tako predhodni kot predvideni trend primarne okužbe s peronosporo na območju **Krasa**.

PERONOSPORA								
35. teden	Zadnjih 7 dni			Napoved za naslednjih 5 dni		Inkubacijska doba		TVEGANJE v naslednjih dneh
Območje	št. primarnih okužb	št. sekundarnih okužb	prisotnost spremljane okužbe	št. primarnih okužb	št. sekundarnih okužb	Začetek	Konec	
italijanski Kras	0	0	SI	0	0	-	-	Srednje-Nizko
slovenski Kras	0	1	SI	0	0	29-avg	29-avg	Srednje-Nizko

Tabela 4: Povzetek podatkov o okužbi s peronosporo *Plasmopara viticola* (Berl. in De Toni) po modelu **Vite.net**® in glede na tedensko spremljanje (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni).

Iz tabele 4 je opaziti, da so na območju Krasa prisotne določene okužbe s peronosporo, odkrite med tedenskim spremljanjem. Pričakuje se srednje-nizko tveganje okužbe.

Oidij - *Erysiphe necator* (Schwein)

OIDIJ						
35. teden	Zadnjih 7 dni		Napoved za naslednjih 5 dni	Razvoj spor		TVEGANJE v naslednjih dneh
Območje	št. primarnih okužb	prisotnost spremljane okužbe	št. okužb z askosporo	Začetek	Konec	
italijanski Kras	0	JA	0	-	-	Nizko
slovenski Kras	0	NE	0	-	-	Nizko

Tabela 5: Povzetek podatkov o okužbi z oidijem *Erysiphe necator* (Schwein) po modelu **Vite.net**® in glede na tedensko spremljanje (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni)

Iz tabele 5 je razvidno nizko tveganje za oidij, ker bi glede na napovedi v naslednjih dneh lahko prišlo do idealnih pogojev za razvoj novih okužb.

FENOLOŠKE FAZE

Fenološke faze spremljanih trt so opisane po indeksu BBCH.

Pri spremljanju 35. tedna je povprečna fenološka faza BBCH 84 (100% zorenje).



Slika 1: Refošk

Terrano		Malvasia Istriana		Vitovska	
Krajna vas 84.0	Sagrado 84.0	Sagrado 85.0	Savogna d'Isonzo 85.0	Duino-Aurisina 84.5	
Sezana 83.5 Obalno-k...	GO		GO		TS
	Savogna d'Isonzo 84.0	Savogna d'Isonzo 84.0			
Komen 83.3	Duino-Aurisina 84.0	Duino-Aurisina 84.0	Cabernet Sauvignon		
	TS		Sagrado 85.0	Savogna d'Isonzo 84.0	GO

Graf 7: Povprečni BBCH indeks sorte, spremljane v tem tednu, glede na občino (**grozd**). Temnejša barva označuje višjo povprečno vrednost BBCH glede na sorto.

Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj; Malvasia Istriana - Istrska malvazija; Terrano - Refošk.


Poročilo z dne 29. avgust 2019

Izdelano v okviru projekta Agrotur II



Graf 8: Primerjava povprečnih fenoloških faz v letih 2018 in 2019.

POVZETEK SLEDENJA




Graf 9: Razširjenost peronospore *Plasmopara viticola* (Berl. in De Toni) na mladih listih glede na sorto (v %). Danno% - škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.


Iz grafa 9 je razvidno, da je trta sorte Vitovska najbolj okužena s peronosporo, in sicer je razširjenost bolezni 8 %. S peronosporo so okužene še sorte refošk.

Poročilo z dne 29. avgust 2019


Izdelano v okviru projekta Agrotur II




Graf 10: Razširjenost peronospore Plasmopara viticola (Berl. in De Toni) glede na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.




Graf 11: Razširjenost oidija Erysiphe necator (Schwein) na sorto (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.




Graf 12: Razširjenost oidija Erysiphe necator (Schwein) na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.



Graf 13: Razširjenost Botrytis cinerea [Pers.] glede na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.



Graf 7: Razširjenost kisle gnilobe glede na občino (%).



Graf 13: Tedenski let pasastega (*Eupoecilia ambiguella* [Hb.]) in križastega (*Lobesia botrana* [Den et Schiff]) gozdnega sukača glede na pokrajino.



Slika 2: Peronospora



Slika 3: Botrytis cinerea

Poročilo z dne 29. avgust 2019

Izdelano v okviru projekta Agrotur II	
---------------------------------------	--

NASVETI ZA ZAŠČITO

Glede na vremenske napovedi, podatke iz modela Vite.net® in ugotovitve priporočamo naslednje ukrepe:
okvirno od 30. do 31. avgust 2019

BIOLOŠKA IN CELOSTNA ZAŠČITA			
Škodljivci	Učinkovina	Doziranje (kg ali l/ha)	Opombe
<i>Peronospora,</i> <i>Black Rot</i>	Bakrov <i>hidroksid</i> ali <i>mešanica hidroksida</i> <i>in oksiklorida</i> ali <i>bordojska mešanica</i>	0,15 Kg/ha (baker, kovina)	Ukrepajte na zgornji strani listja. Če je okužba v teku, je bolje uporabiti bakrov hidroksid

Priporočamo, da na komercialnih izdelkih natančno preberete etiketo, pri čemer bodite pozorni predvsem na koncentracijo učinkovin. Po potrebi prilagodite doziranje na hektar glede na navodila iz tabele.
Priporočamo, da upoštevate doziranje, navedeno na etiketi izdelka.

Poročilo z dne 23. maj 2018

Izdelano v okviru projekta Agrotur II

OBVESTILA

Vsem ciljnim kmetijam,

V okviru dejavnosti projekta Agrotour II imajo kmetije, ki so vključene v spremljanje trt, na voljo potisna obvestila aplikacije **4Grapes**, s katerimi so uporabniki obveščeni o posebnostih (napadih oidija ali peronospori), ki bi se lahko pojavile v spremljanih območjih.

Storitev je brezplačna, koristite pa jo lahko tako, da si iz spletne trgovine na svojo napravo snamete aplikacijo.

- za naprave android

(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quindes.fourgrapes>)

- za naprave Apple (<https://itunes.apple.com/it/app/4grapes/id1204776856?mt=8>)

Po tem, ko napravo nastavite in vanjo vnesete potrebne podatke, morate na elektronski naslov support@4grapes.it poslati sporočilo, v katerem navedete ime kmetije.

Storitev spremljanja trt predvideva:

- pogodbo z zaposlenim na projektu, ki bo na voljo za pregled nekaterih nasadov trt na kmetiji;
- možnost stika z registriranim svetovalcem na področju fitopatologije, ki je usposobljen za svetovanje na področju trajnostne rabe fitosanitarnih izdelkov in alternativnih metod zaščite kot predvideva veljavna zakonodaja (direktiva 2009/128 ES), in s strokovnjakom na področju pridelovanja vina;
- podatki, ki bodo pridobljeni s spremljanjem nasadov, bodo sproti na voljo prek aplikacije **4Grapes**, vključno z obvestili o morebitnih okužbah in stopnjah tveganja;
- območno tedensko poročilo, v katerem bodo povzeti podatki o spremljanju, morebitnih tveganjih, navodila za izvajanje ukrepov z morebitnimi posebnostmi glede na kmetijo, ko je to potrebno.

Poročilo z dne 23. maj 2018

Izdelano v okviru projekta Agrotur II	
---------------------------------------	--

STIKI

dr. Giovanni BIGOT

✉ giovannibigot@gmail.com

☎ +39 349 2378086

dr. Giacomo NUNIN

✉ giacomo.nunin@gmail.com

☎ +39 334 2718712

Davide GAGGIOLA

✉ davide.gaggiola@perleuve.it

☎ +39 342 6487213

Poročilo z dne 23. maj 2018

Izdelano v okviru projekta Agrotur II	
---------------------------------------	--